Liali bidona

Vass8R05s136-140



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1475

uluituuluutuuluutuuluutual

Of Rish Jacob Mo

Liali bidona Cl8 R5 s 136. 140

revoir o 136









ANNEE 1987 NOM Liali bidona EMPLACEMENT 8 R5 1136. 140

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f	Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2		31,3 27.3	3.4	0							
3 4 5	3 2	31.3 31.3 31.3	3.4 3.4 3.4	0 0							
	15		2,4	0	0			Pan	V esse	al'	
			+6	C				Vii	r évi	2	

daitadantadantadantad

ANNEE 1988 NOM Liali bidona

EMPLACEMENT & R5 1136.140

ni

0

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v	Maturité
1 2 3 4 5	4	21.3	25.3	P350000	O Port :	m'enge	Vi	gueur	: 2,5 Par	Clc	

ANNEE 1989

NOM hiali bidona EMPLACEMENT 8 R5 s 136-140

ni

doctorbotorbotorbotorb

1.1			and the													
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f			raison mi/v		Maturité				
1 2 3 4 5	4	163	163 · 163 · 163 · 203 ·	0	0			,								
Pou	rritur		6 .3 .89 .	Mill. :		Port :		eng	e' v	igueu	: 3					

A	NNEE	1991												
NO	OM Lie	la bi	dona		EMPLACE	EMPLACEMENT 8 Rg 5 1136-140								
		mi					V							
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement.	Ferti- lité	Ferti Floraison début mi/f fin				raison mi/v	Maturité				
1	4			0										
2	2			0					and the second					
3	4			0	Grappe	: G	M - P	Dim :		Compac	cité	: L - M- C		
4	6			0	Pour : Baie :		Section between the) i m -					
5	6			0		disc-sp				-fus				
					Couleu	r : B-0	Gr-Rs-	Rg-N	đus :	inc -	- col	oré		
					Saveur	: s -	m - a:	r - fo	x - he	erb				
					Pépins	avec	- apy	yrène						
	The state of the s				Port :	erig.	2-	Vi	gueur	: 3,5				

1992 EMPLACEMENT 8 R5 136.140 Liali bidona NOM Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 0 2 0 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill ; 0 4 4 Baie: TG - G - M - P Dim: 0 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur : *

ulaitanlaataaleataalaataal

AMMER: 1996
HOM Liali bidona EMPLACIMENT, 8 R5 1136, 140

4

Juntum Innternational

00	213.	79							1			1		
iche	Whre		rranent				raison		Véraison début mi/v fin Daturit					
	yeux	debut	mi/deb	grap	lité	debut	mi/f	run	debut	m1/V	Lin	naturite.		
ı	87	18,5	25,31	0										
2	1072	M.3	25,34	0										
3	7.72	11.3	25,34	0	Grappe	Grappo: G - M - P Dim: Compacité: L - H- C								
4	MTL	2812	-18,3	0	Pour: Mill: uaie: TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
5	1271	- 28,2	-18,30	0 .										
	λ	le 25	3.96		Couleu	<u>r</u> : B-0	Jr-Rs-	Ry-N	đus :	tuc -	- col	oré		
	2		(+9)		Saveur	: 8	m - a	r - fo	ox - he	erb				
					Pépins	1 avec	e – ap	yrène						
					Fort: Vigueur:									

ANUEE: 1997 MOM Liali bidona BMPLACHERIN & R 5 & 136-140 ni Nbre Débourrement Ubre Floraison Véraison Maturité Fertiche début mi/déb lité yeux grap 13TL 0 3 0 0 JOTL Crappe : G - M - P Dim : Compacitó: L - M -C. 0 10TL Pour : Mill : 0 12TL Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb <u>Pópins</u> : avec - apyrène Fort : Vigueur : ~

deitedentedentedented

4

Luntumhorti adamindan

	ом ೧ व्यवस्यः:	1998	3 bidona		ЕПРЬ Л СЧ	мант .	8 R5	130 A3	6. 140			TL
iche	iche Bbre Débourrment Ubre yeux début mi/déb grap						raison mi/E		Vé début	raison mi/v	Fin	Habur I Lé
A1 2 3 L4 7L5	7 1 3 10 13			000011	Pour :	Te - disc-sp disc-sp g : B-c : s -	+9 Mil ; - !! ph-ell ir -Rs- m - a	1: - P -ov-o Rg-N r - f yrène	Dim: bov-cy dus ox - bo	l-fus : fuc erb		B 30,9 +7 : 1 ::- C

N° d'ordre :

Désignation : Liali bidona

Emplacement : Ll 8 Ls A 136-140 (5.136)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité

laineuse (79)

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert (190).

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

44

<u>luntuulunti</u>uduutiinin

Face inférieure: glabres (199) - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente (280) - sans villosité laineuse (281)

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - dutres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabré (20) - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente (84) - sans villosité laineuse (85).

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte (3).

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

4 Juntum mutu

> Liali bidona 8 R5 s- 136- 140 (s.139

divitadimtadentiadimtad

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 253 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

Liali bidona 8 R50-136-140 (1,139)

divitadimtadentindimtad

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

+ 1 Imminulumin

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte (6) - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calo 86

Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année 1999
Code cépage:
Nom cépage: Lidi bidond

+ 1 <u>Imministration to</u>

Observateur:

Emplacement 8 RS 3 136-140

divitionlymbrodentianlymbrod

Grappe

oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidal 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) (7 -) très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) (5) large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme D uniforme 3. ojy 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3)- ovoide 4 - troncovoïde 5)- obovoïde 6 ylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge viole 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1- uniforme 2. oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7) très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9. oiv 229 ombilic : peu apparent(1) apparent 2. oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée () colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée D- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9 oiv 232 succulence pulpe: peu juteus (1)- juteus e 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7) très élevée 9 oiv 236 saveur : aucune D- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5. oiv 236* saveur : aucune 1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) (3)- moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (>10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes (1) présentes 2

Liali bidona DENOMINATION : 8 R5 136-140 (4.1) EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2) Sarment

44

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

nhaitaahaataaheataahaataal

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre : L'ali bidona

Emplacement : 8 R5 1136.140

44

luntum luntu milantum lun

```
: (1)-(2)- 3
Angle des nervures
                                    : 4 - 5 - 6
Sexe
                                     : (7)-(8)-9
L_1/L_2
                                    : 10 - (11)
L2/L
                                   : 12 - 13 - (4)-(15) - 16
Nombre de lobes

      Prof. sinus latéral Sup.
      : 17 - 18 - 19 - 20

      Prof. sinus latéral Inf.
      : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 + 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                     : (40) - 41
Dents : forme
                                     : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                          : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
                                   : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90

doitadantadeatadantad